

SANDACZ /Stizostedion lucioperca/



W Europie występuje w większości wschodnich rzek nizinnych. Zachodnią granicą występowania jest Łaba. Dobrze czuje się też w zbiornikach zaporowych a nawet w stawach hodowlanych. Występuje też w naszych Gliniankach.

Jest drapieżnikiem. Jego pokarm stanowią najczęściej jazgarze, okonie a także inne małe ryby. Poluje grupowo, większe osobniki nawet w niewielkich stadach. W ciągu dnia trzymają się większych głębokości, wieczorem i nocą podpływają za pokarmem do samego brzegu.

Trą się pod koniec wiosny. Samice składają od 10 000 do 500 000 jaj, zależnie od wielkości, na uprzednio przygotowanych miejscach piaszczystego dna, na niewielkiej głębokości. Gniazda takie są pilnowane i zaciekle bronione przez samców.

Po roku narybek osiąga 10 ÷ 15 cm długości, a w ósmym może osiągać do 70cm. Duże egzemplarze

przybierają szybko na wadze, osiągając 10 ÷ 15 a nawet 20kg wagi.

Spośród gatunków z rodziny okoniowatych ma największe znaczenie gospodarcze. Jest także bardzo ceniony przez wędkarzy specjalizujących się w połowach drapieżników.

Zgodnie z regulaminem PZW przy połowach sandacza obowiązują ograniczenia:

- Wymiar ochronny 45cm
- Dzienny limit połowu 3 sztuki (łącznie ze szczupakiem, boleniem, karpem, amurem, brzaną, lipieniem i pstrągiem potokowym)
- Okres ochronny 1 stycznia do 31 maja